Přehled souborů lesních typů ČR

Ekologická řada	EXTRÉMNÍ		KYSELÁ			KYSELÁ	ŽIVNÁ						OBOHACENÁ HUMUSEM			OBOHACENÁ VODOU			OGLEJENÁ			GLEJOVÁ		RAŠELINNÁ
Edafická kategorie	bazická zakrslá	zakrslá	skeletová	chudá	kyselá	kyselá kamenitá	svěží	svěží kamenitá	vysýchavá	bohatá	vápencová	hlinitá	obohacená	obohacená kamenitá	obohacená skeletová	lužní	úžlabní	vlhká	oglejená svěží	oglejená kyselá	oglejená chudá	glejová	glejová chudá	rašelinná
	X	Z	Y	M	K	N	I	S	F	C	B	W	H	D	A	J	L	U	V	O	P	Q	G	T	R
Lesní vegetační stupeň																									
10 Alpínský		10Z ARKTOALPINUM																							
9 Klečový		9Z KLEČ		9K Klečová SMRČINA																					9R VRCHOVIŠTĚ
8 Smrkový		8Z Zakrslá jeřábová SMRČINA	8Y Skeletová SMRČINA	8M Chudá SMRČINA	8K Kyselá SMRČINA	8N Kyselá kamenitá SMRČINA		8S Svěží SMRČINA	8F Svěží kamenitá SMRČINA						6J			8V Vlhká klenová SMRČINA	8O Oglejená svěží SMRČINA	8P Oglejená kyselá SMRČINA	8Q Oglejená chudá SMRČINA	8G Glejová SMRČINA	8T Glejová chudá zakrslá SMRČINA	8R Vrchovištní SMRČINA
7 Bukosmrkový		7Z Zakrslá buková SMRČINA	7Y Skeletová buková SMRČINA	7M Chudá buková SMRČINA	7K Kyselá buková SMRČINA	7N Kyselá kamenitá buková SMRČINA		7S Svěží buková SMRČINA	7F Svěží kamenitá buková SMRČINA					7A Obohacená kamenitá klenobuková SMRČINA		7L Smrkový LUH		7V Vlhká buková SMRČINA	7O Oglejená svěží jedlová SMRČINA	7P Oglejená kyselá jedlová SMRČINA	7Q Oglejená chudá jedlová SMRČINA	7G Glejová SMRČINA	7T Glejová chudá jedlová SMRČINA	7R Kyselá rašelinná SMRČINA
6 Smrkobukový		6Z Zakrslá smrková BUČINA	6Y Skeletová smrková BUČINA	6M Chudá smrková BUČINA	6K Kyselá smrková BUČINA	6N Kyselá kamenitá smrková BUČINA	6I Kyselá hlinitá smrková BUČINA	6S Svěží smrková BUČINA	6F Svěží kamenitá smrková BUČINA		6B Bohatá smrková BUČINA		6H Hlinitá smrková BUČINA	6D Obohacená smrková BUČINA	6A Obohacená kamenitá klenosmrková BUČINA	Obohacená skeletová jilmová JAVOŘINA	6L LUH olše šedé		6V Vlhká smrková BUČINA	6O Oglejená svěží smrková JEDLINA	6P Oglejená kyselá smrková JEDLINA	6Q Oglejená chudá smrková JEDLINA	6G Glejová smrková JEDLINA	6T Glejová chudá smrková JEDLINA	6R Kyselá rašelinná SMRČINA
5 Jedlobukový		5Z Zakrslá jedlová BUČINA	5Y Skeletová jedlová BUČINA	5M Chudá jedlová BUČINA	5K Kyselá jedlová BUČINA	5N Kyselá kamenitá jedlová BUČINA	5I Kyselá hlinitá jedlová BUČINA	5S Svěží jedlová BUČINA	5F Svěží kamenitá jedlová BUČINA	5C Vysýchavá jedlová BUČINA	5B Bohatá jedlová BUČINA	5W Vápencová jedlová BUČINA	5H Hlinitá jedlová BUČINA	5D Obohacená jedlová BUČINA	5A Obohacená kamenitá klenová BUČINA	5J Obohacená skeletová jilmová JAVOŘINA	5L LUH olše (jasano)břízový	5U Úžlabní jasanová JAVOŘINA	5V Vlhká jedlová BUČINA	5O Oglejená svěží (bukový) JEDLINA	5P Oglejená kyselá JEDLINA	5Q Oglejená chudá JEDLINA	5G Glejová JEDLINA	5T Glejová chudá JEDLINA	
4 Bukový	4X Bazická zakrslá BUČINA	4Z Zakrslá BUČINA	4Y Skeletová BUČINA	4M Chudá BUČINA	4K Kyselá BUČINA	4N Kyselá kamenitá BUČINA	4I Kyselá hlinitá BUČINA	4S Svěží BUČINA	4F Svěží kamenitá BUČINA	4C Vysýchavá BUČINA	4B Bohatá BUČINA	4W Vápencová BUČINA	4H Hlinitá BUČINA	4D Obohacená BUČINA	4A Obohacená kamenitá lipová BUČINA		4L Podhorský LUH	4V Vlhká BUČINA	4O Oglejená svěží dubová JEDLINA	4P Oglejená kyselá dubová JEDLINA	4Q Oglejená chudá dubová JEDLINA	4G Glejová dubová JEDLINA	4T Glejová chudá dubová JEDLINA	4R Svěží rašelinná SMRČINA
3 Dubobukový	3X Bazická zakrslá dubová BUČINA	3Z Zakrslá dubová BUČINA	3Y Skeletová dubová BUČINA	3M Chudá dubová BUČINA	3K Kyselá dubová BUČINA	3N Kyselá kamenitá dubová BUČINA	3I Kyselá hlinitá dubová BUČINA	3S Svěží dubová BUČINA	3F Svěží kamenitá dubová BUČINA	3C Vysýchavá dubová BUČINA	3B Bohatá dubová BUČINA	3W Vápencová dubová BUČINA	3H Hlinitá dubová BUČINA	3D Obohacená dubová BUČINA	3A Obohacená kamenitá lipodubová BUČINA	3J Obohacená skeletová lipová JAVOŘINA	3L Jasanooolšový LUH	3U Úžlabní javorová JASENINA	3V Vlhká dubová BUČINA	3O Oglejená svěží jedlodubová BUČINA	3P Oglejená kyselá jedlová DOUBRAVA	3Q Oglejená chudá jedlová DOUBRAVA	3G Glejová jedlová DOUBRAVA	3T Glejová chudá jedlová DOUBRAVA	3R Kyselá rašelinná reliktní borová SMRČINA
2 Bukodubový	2X Bazická zakrslá buková DOUBRAVA	2Z Zakrslá buková DOUBRAVA	2Y Skeletová buková DOUBRAVA	2M Chudá buková DOUBRAVA	2K Kyselá buková DOUBRAVA	2N Kyselá kamenitá buková DOUBRAVA	2I Kyselá hlinitá dubová DOUBRAVA	2S Svěží buková DOUBRAVA	2F Svěží kamenitá buková DOUBRAVA	2C Vysýchavá buková DOUBRAVA	2B Bohatá buková DOUBRAVA	2W Vápencová buková DOUBRAVA	2H Hlinitá buková DOUBRAVA	2D Obohacená buková DOUBRAVA	2A Obohacená kamenitá javorobuková DOUBRAVA		2L Jasanooolšový LUH	Úžlabní javorová JASENINA	2V Vlhká buková DOUBRAVA	2O Oglejená svěží jedlo(buková) DOUBRAVA	2P Oglejená kyselá DOUBRAVA s jedlí	2Q Oglejená chudá DOUBRAVA s jedlí	2G Glejová DOUBRAVA s jedlí	2T Glejová chudá DOUBRAVA s jedlí	
1 Dubový	1X Bazická zakrslá DOUBRAVA	1Z Zakrslá DOUBRAVA		1M Chudá borová DOUBRAVA	1K Kyselá DOUBRAVA	1N Kyselá kamenitá DOUBRAVA	1I Kyselá hlinitá DOUBRAVA	1S Svěží DOUBRAVA	1F Svěží kamenitá habrová DOUBRAVA	1C Vysýchavá habrová DOUBRAVA	1B Bohatá habrová DOUBRAVA		1H Hlinitá habrová DOUBRAVA	1D Obohacená habrová DOUBRAVA	1A Obohacená kamenitá javorohabrová DOUBRAVA	1J Obohacená skeletová habrová JAVOŘINA	1L Pahořkatinný LUH		1V Vlhká habrová DOUBRAVA	1O Oglejená svěží lipová DOUBRAVA	1P Oglejená kyselá březová DOUBRAVA	1Q Oglejená chudá DOUBRAVA	1G Mokřadní OLŠINA	1T Mokřadní březová OLŠINA	1R Rašelinná OLŠINA
0 Společenstva borů a společenstva s přirozeně vysokým podílem borovice	0X Bazický zakrslý BOR	0Z Zakrslý BOR	0Y Skeletový BOR	0M Chudý BOR	0K Kyselý BOR	0N Kyselý kamenitý BOR		0C Hadcový BOR											0O Oglejený svěží BOR	0P Oglejený kyselý BOR	0Q Oglejený chudý BOR	0G Glejový smrkový BOR	0T Glejový chudý březový BOR	0R Rašelinný BOR

LESNÍ VEGETAČNÍ STUPEŇ – vyjadřuje závislost změn vegetace na změnách výškového a expozičního klimatu. Nositeli vegetační stupňovitosti v ČR jsou dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk obecný (Picea abies) a kleč horská (Pinus mugo), podle nichž byly jednotlivé lesní vegetační stupně nazvány, a to z důvodu dominance či významného vlivu na formování společenstva. V České republice je vyšleno 10 vegetačních stupňů.

EKOLOGICKÁ ŘADA – sdružuje edafické kategorie podle jejich ekologické příbuznosti.

EDAFICKÁ KATEGORIE – je určena nejdůležitějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi půd a tvary terénu.

SOUBOR LESNÍCH TYPŮ – sdružuje lesní typy podle jejich ekologické podobnosti.

LESNÍ TYP – je základní lesnická typologická jednotka, představující soubor přirozených a změněných biogeocenóz (lesních ekosystémů) vývojově k sobě patřících. Je to jednotka s určitým rozpětím přírodních podmínek pro růst dřevin, jejich produkci a obnovu, a v důsledku toho i pro žádoucí druhovou a prostorovou skladbu lesů a podobnost hospodářských opatření. Lesní typ je charakterizován významnou kombinací druhů příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou dřevin.

Lesní typy jsou mapovacími jednotkami lesnických typologických map.